

ГЕРБИЦИД

**Когорта®**

Общая  
характеристика

avgust   
crop protection

**Препаративная форма**  
водно-гликолевый раствор

**Культуры**  
СОЯ

**Спектр действия**  
однолетние двудольные сорняки,  
в том числе устойчивые к другим  
группам гербицидов

---

**бентазон, 330 г/л**  
**+ фомесафен, 150 г/л**

---

ГЕРБИЦИД

**Когорта®**

Преимущества

avgust   
crop protection

- эффективное уничтожение широкого спектра однолетних двудольных сорняков, в т. ч. амброзии полыннолистной, видов щирицы, пикульника, горца, а также падалицы подсолнечника
- высокая скорость действия
- сдерживание второй «волны» двудольных сорняков
- защита сои в наиболее уязвимые фазы ее развития
- отличная совместимость с препаратами-партнерами

ГЕРБИЦИД

# Когорта®

## Чувствительные сорняки

avgust   
crop protection

Однолетние двудольные сорняки, в том числе:

- виды щирицы
- виды пикульника
- дурнишник обыкновенный
- канатник Теофраста
- падалица подсолнечника
- паслен черный
- подмаренник цепкий

Подавляет развитие корнеотпрысковых сорняков:

- бодяк полевой
- осот желтый

Оказывает некоторое воздействие и на отдельные виды злаковых сорняков, например, просо куриное (в фазах всходы - первые два листа)

**ГЕРБИЦИД**

# Когорта®

## Механизм действия

**Бентазон** проникает в сорные растения преимущественно через зеленые части, обладает контактным действием.

**Фомесафен** обладает контактным действием, воздействует на побеги, листья и корневую систему. Останавливает появление всходов сорняков за счет создания гербицидного «экрана»



**ГЕРБИЦИД**

# Когорта®

## Скорость воздействия

---

**Начинает действовать в течение  
нескольких часов после обработки**

---

### **Через 1 - 3 дня**

первые симптомы гербицидного действия  
(обесцвечивание и побурение точек роста,  
затем хлороз растений)

### **Через 1 - 2 недели**

окончательная гибель сорняков

